



Hygieneplan–Schweinehaltung


Zur Bekämpfung der Erreger von: Schweinepest, Aujeszkysche Krankheit, Salmonellose, Dysenterie (Ruhr), Parvovirose, Enterotoxämie, Circoerkrankung, Schweinerotlauf, PIA, APP, PRRS, MKS, Schnüffelkrankheit, Mycoplasmen, Pasteurellose, Coronaviren, Rotaviren, Influenza, Clostridien, Kokzidien, Spulwurmeier u.a.

	WAS	WO	WOMIT	%	HINWEIS
--	-----	----	-------	---	---------

Reinigung und Desinfektion im leeren Stall:

	Stallreiniger für Fett- und Eiweisablagerungen	Wände, Decken, Böden	ULTRAFOAM	2-4%	Auf die trockenen Oberflächen auftragen. Einwirkzeit: 20 min.
			AGAFOAM B	2-4%	
	Spezialdesinfektion: Kokzidien, Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Viren und Pilze	Böden, Geräte, Wände bis 1m	AGAKOK 2.5 	2,5%	Nach der Reinigung. Auf die trockenen Oberflächen aufbringen Einwirkzeit: 120min.
	Flächendesinfektion: Bakterien, Viren, Pilze	Wände, Decken, Böden	AGACID 5+  	2%	Nach der Desinfektion mit AGAKOK 2.5 Einwirkzeit: 120 min.
			Virex 	1,5%	

Spezielle Hygienemaßnahmen

	Desinfektion: Viren, Bakterien, Pilze	Schuhe / Stiefel	VIREX 	1%	Vor und nach der Stallarbeit. Gebrauchslösung regelmäßig wechseln.
	Desinfektion: Viren, Bakterien, Pilze	Fahrzeuge: LKW, PKW, Schlepper	VIREX 	1%	Nach Fahrzeugreinigung auf die trockenen Oberflächen ausbringen. Einwirkzeit : 120 min.
	Hygienisierung, entfernt schleimige und mineralische Ablagerungen	Tränkelinien	VIREX 	0,1%	Nach Impf-, Medikamenten- und Vitaminzugaben

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.